



سریم استخدام

sariestekhdam.ir

برای دریافت پکیج کامل سوالات اینجا کلیک کنید

در سونوگرافی ترانس واژینال کاند یافته در آندومتر یوز رکتواژینال دیده می شود

الف) توده با اکو هتروژن ☒

ب) کیسه ساده

ج) آزاد مایع

د) ضخامت آندومتر کم

در معاینه پستان زن جوان کاند یافته به فیبروآدنوما اشاره دارد

الف) توده نرم و قابل حرکت ☒

ب) توده سفت و چسبیده

ج) ترشح خونی

د) پوست پرتقالی

در بارداری کاند علامت در سه ماهه اول طبیعی است

الف) تهوع ☒

ب) درد شدید پهلو

ج) خونریزی زیاد

د) تب بالا

در سونوگرافی برای تشخیص حاملگی مولار کامل کاند یافته مهم است

الف) برفکوله ☒

ب) کیسه حاملگی خالی

(ج) طول تاج تا دنبالچه کم

(د) قطر تخمدان زیاد

در درمان سوزاک در زن غیرباردار کاند آنتی بیوتیک مقاوم به بتالاکتام است

الف) آزیترومایسین ✓

ب) سفتریاکسون

ج) آموکسی سیلین

د) سیپروفلوکساسین

در معاینه نوزاد با سفالیه موفقیت طبیعی سر بعد از تولد چگونه است

الف) اکسیپیتال خلفی ✓

ب) اکسیپیتال قدامی

ج) فیس

د) برج

در زایمان پره مچرتی کاند دارو برای ریپنینگ سرویکس موثرتر است

الف) میزوپروستول واژینال ✓

ب) اکسی توسین

ج) متیل ارگونوین

د) کاربوپرست

در سونوگرافی برای تشخیص سندرم داون در سه ماهه دوم کاند یافته مهم است

الف) استخوان بینی غیرقابل مشاهده ✓

ب) قطر کیسه حاملگی

ج) طول استخوان ران زیاد

د) قطر تخمدان

در معاینه لگن زن با آندومتریوز کاند یافته کلاسیک است

الف) توده ثابت در فورنیکس ✓

ب) گردن رحم نرم

ج) ضربه سریع مثبت

د) براکستون هیکس

در مرحله سوم زایمان کاند مدت زمان برای خروج جفت نرمال است

الف) سی دقیقه ☒

ب) ده دقیقه

ج) شصت دقیقه

د) پنج دقیقه

در معاینه پستان کاند یافته به سرطان التهابی اشاره دارد

الف) پوست پرتقالی ☒

ب) توده نرم

ج) ترشح شفاف

د) درد سیکلی

در بارداری کاند علامت در سه ماهه سوم هشدار دهنده پره اکلامپسی است

الف) درد پهلو ☒

ب) تهوع صبحگاهی

ج) براکتون هیکس

د) افزایش وزن یک کیلویی

در سونوگرافی ترانس واژینال برای تشخیص حاملگی اکتوپیک کاند یافته مهم است

الف) کیسه حاملگی خالی در رحم ☒

ب) کیسه حاملگی در تخمدان

ج) آزاد مایع در داگلاس

د) ضخامت آندومتر کم

در درمان خونریزی بعد از زایمان کاند دارو برای آتونی رحمی اول است

الف) اکسی توسین ☒

ب) متیل ارگونوین

ج) کاربوپرست

د) میزوپروستول

در معاینه نوزاد با هیپوگلاسمی کاند علامت زودرس است

الف) لرزش ☒

ب) زردی

ج) برادی کاردی

د) اکزومفالوس

در سونوگرافی برای تشخیص سندرم تورتن کاند اندازه گیری مهم است

الف) طول تاج تا دنبالچه ☒

ب) قطر کیسه حاملگی

ج) قطر تخمدان

د) ضخامت آندومتر

در معاینه لگن زن با فیبرومیوم رحمی کاند یافته کلاسیک است

الف) رحم سفت و نامنظم ☒

ب) گردن رحم نرم

ج) ضربه سریع مثبت

د) براکستون هیکس

در زایمان پره مچرتی کاند دارو برای القا موثرتر است

الف) اکسی توسین ☒

ب) متیل ارگونوین

ج) کاربوپرست

د) میزوپروستول

در سونوگرافی ترانس واژینال کاند یافته در آندومتریوز رکتواژینال دیده می شود

الف) توده با اکو هتروژن ☒

ب) کیسه ساده

ج) آزاد مایع

د) ضخامت آندومتر کم

در معاینه پستان زن جوان کاند یافته به فیبروآدنوما اشاره دارد

الف) توده نرم و قابل حرکت ☒

ب) توده سفت و چسبیده

ج) ترشح خونی

د) پوست پرتقالی

در بارداری کاند علامت در سه ماهه اول طبیعی است

الف) تهوع ☒

ب) درد شدید پهلو

ج) خونریزی زیاد

د) تب بالا

درمان اسهال